Cleft Palate Associated with Congenital Lipoma of the Palate in a Newborn

Jae Hee Lee, M.D., Min Seon Choi, M.D., Jeong Yeol Yang, M.D., Ph.D.*, and Sang Kee Park, M.D., Ph.D.

Departments of Pediatrics, Plastic and Reconstructive Surgery*, Chosun University School of Medicine, Gwangju, Korea

ABSTRACT

Lipoma is relatively uncommon in the oral cavity, representing 1–5% of benign oral tumors. Lipoma of the oral cavity may occur in any region; the buccal mucosa, tongue, lip, and mouth floor are among the common sites. The majority of cases of oral lipoma occur after the age of 40 years, and it is not observed frequently in children. Congenital lipoma of the palate is extremely rare. Here we present a rare case of congenital lipoma of the palate associated with cleft palate of a neonate, and review the relevant literature. Surgical excision of the tumor was successful. The present case is the third case of congenital lipoma of the palate associated with cleft palate reported in the literature.

Key Words: Congenital lipoma, Cleft palate, Oral lipoma

Received: 10 November 2014

Revised: 18 December 2014

Accepted: 18 December 2014

Correspondence to:

Sang Kee Park, M.D., Ph.D.

Department of Pediatrics, Chosun University School of Medicine, 365 Pilmun-daero, Dong-gu, Gwangju 501-717, Korea

Tel: +82-62-220-3043

Fax: +82-62-227-2904

E-mail: skpark@chosun.ac.kr

서론

지방종은 연조직에 발생하는 양성종양으로 신체의 어느 부위에서도 발생할 수 있으나, 단지 1–4% 정도만 구강 내에서 발생하는 것으로 알려져 있다¹⁾. 구강 내 지방종은 주로 볼 점막과 혀, 입술 부위에 발생하며 구개열과 동반되어 구개에 발생한 경우는 매우 드물어서, 문헌상으로 단 2례만 보고되었다^{2,3)}. 이에 저자들은 신생아에서 구개열과 동반된 구개의 선천성 지방종 1례를 경험하여 보고하는 바이다.

증례

생후 1일된 여아가 출생 직후 발견된 연구개의 종괴를 주소로 입원하였다. 환자는 Para 2-0-0-2인 27세 산모에게서 재태연령 38주 2일, 출생체중 2.52 kg으로 타병원에서 전치태반으로 제왕절개로 태어났고, 아파가 점수는 1분 8점, 5분 10점이었다. 산전 진찰에서 특이 소견은 없었다. 가족력에서 구개열과 구순열 등 선천성 기형은 없었다. 환자는 수유 곤란은 있었으나 호흡곤란은 없었다. 입원 당시 맥박수는 분당 128회, 호흡수는 분당 50회, 체온은 36.3℃였다. 체중은 2.52 kg (10–25 백분위수), 신장은 45.7 cm (10–25 백분위수), 두위는 32 cm (<10 백분위수)이었다. 구강 내에는 연구개에서 시작된 2.5×1.5 cm 크기의 주위 점

Copyright(c)

By Korean Society of Neonatology.

All right reserved.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

막조직과 비슷한 분홍색의 종괴가 관찰되었다(Figure 1). 종괴는 대칭적으로 팽창되었고, 흉부함몰 소견은 없었다. 복부 진찰에서 종괴나 장기 비대는 촉진되지 않았다. 그 외에 진찰 소견에서 이상 소견은 없었다.

말초혈액검사에서 전체혈구계산, 간기능검사, 및 혈청 전해질 검사는 정상이었으며 염색체 검사는 46, XX로 정상이었다. 자기공명영상 검사에서는 연구개에서 기시한 1.8 cm 크기의 연조직 종괴가 관찰되었다(Figure 2). 흉부 방사선 사진, 뇌초음파, 심장 초음파, 그리고 복부 초음파에서는 정상 소견을 보였다.

종괴로 인한 수유장애로 비위관을 통하여 수유를 진행하였다. 환자는 전신마취로 종괴 절제술을 시행하였다. 종괴절제술 후 종괴에 의해 가려져서 보이지 않았던 연구개의 구개열을 볼 수 있었다(Figure 3). 병리적 소견에서는 얇은 섬유조직에 쌓여있는 균일한 지방조직을 관찰할 수 있어서 지방종으로 확인되었다(Figure 4). 환자는 수술 이후 특수 젖병으로 수유가 잘 진행되었고, 구개열에 대한 수술은 만 1세에 시행하기로 계획하고 퇴원하

였다.

고찰

지방종은 연조직에서 기원한 성숙한 지방조직으로 이루어진 흔한 양성종양으로 주로 몸통과 팔, 경부에 발생을 한다. 그러나 구강 내에 발생하는 경우는 매우 드물다고 알려져 있다. 지방종 중 15-20%가 두경부에서 발생을 하고, 구강 내에 지방종이 발생하는 경우는 1-4%에 불과하다고 알려져 있다¹⁾. 구강 내 지방종은 주로 볼점막, 혀, 그리고 입술에 발생을 하며, 구개에 발생하는 경우는 매우 드물다. Taira 등⁴⁾이 1987년부터 2004년까지 일본에서 보고된 구강 내 지방종 207 증례를 분석하였는데, 발생부위는 볼점막(84례), 혀(37례), 입술(26례), 잇몸(18례) 순이었고, 단지 10례(4.8%)만이 구개에서 발생하였다. Furlong 등⁵⁾이 보고한 구

Figure 1. A 2.5 × 1.5-cm soft tissue mass on the soft palate (white arrow).

Figure 2. Enhanced T1-weighted magnetic resonance images showing a well-defined 1.8 cm mass (white arrow) arising from the soft palate.

Figure 3. Cleft of the soft palate after lipoma resection (white arrow).

Figure 4. Microscopic finding of resected lipoma showing mature adipocytes surrounded by a thin fibrous tissue (hematoxylin & eosin stain, ×200).

강과 상악안면부위에 발생한 125례의 보고에서도 지방종은 주로 이하선(30례), 볼점막(29례), 입술(21례), 악하부(17례), 혀(15례) 순으로 발생하였고, 6례(4.8%)가 구개에 발생되었다고 하였다. Fregnani 등¹⁾이 보고한 46례와 Manor 등⁶⁾이 보고한 58례의 구강 내 지방종 보고에서는 구개에 발생된 증례는 없다고 하였다.

지방종이 발생하는 평균 연령은 52-59세로 주로 40세에서 60세 사이에 대부분 발생을 한다. 소아에서 발생하는 경우는 구강 내 지방종 환자의 1-4%에서만 발생을 한다⁴⁻⁶⁾. Furlong 등⁵⁾이 보고한 125례의 보고에서는 18세 미만의 소아에서 발생한 경우는 단 4례(3.2%)에 불과했으며, 가장 일찍 발생한 환자의 나이는 9세이었다. 또한 58례의 지방종 보고에서도 18세 미만의 환자는 11세에 진단된 1례(1.7%) 뿐 이었다⁶⁾. 이번 증례와 같은 선천성 지방종의 보고는 극히 드물다. 본 증례와 같이 구개열과 동반된 선천성 지방종은 지금까지 단 2례만 문헌에서 보고가 되어 있는데, 8개월 남아와 6세 남아에서 출생 시부터 존재한 구개열과 구개의 지방종이 있었으며, 모두 수술적 제거를 하였다^{2,3)}. 그 외에 6개월 여아, 7개월 남아, 그리고 20일된 여아에서 입술, 구강전정(fornix of vestibule), 그리고 혀에 각각 지방종이 발생된 보고가 있다⁷⁻⁹⁾. 선천성 지방종이 구강안면수족지증후군(ora-facial-digital syndrome)의 증상으로 발생한 증례도 있다¹⁰⁾. 그러나 본 증례에서는 구개에 발생된 지방종과 구개열 이외의 다른 기형은 관찰되지 않았다.

본 증례와 같이 선천성 지방종에서 구개열이 발생한 기전은 명확히 알려진 바는 없다. 다만 배아기에 구강과 비강 사이에서 발생된 구개판(palatal shelf)이 서로 융합되어 구개가 형성이 되는데, 선천성 지방종이 이 융합과정을 방해하여 구개열이 발생했을 것으로 추정을 한다^{2,3)}.

지방종은 촉진시 잘 움직이는 종괴로 보통 통증을 유발하지는 않지만, 이물질감, 종창, 불편감의 증상을 유발한다. 그러나 그 크기와 위치에 따라서는 수유곤란이나 연하곤란, 혹은 호흡곤란을 일으킬 수 있다¹¹⁾. 이번 증례의 환자도 구개에 발생된 구개열과 동반된 지방종으로 수유곤란이 동반되어 비위관을 통한 식이를 진행하였다.

신생아의 구강 내 종양이 있을 때 지방종과 감별해야 하는 질환으로는 기형종, 림프관종, 선천성 치은종(congenital epulis), 수막뇌류, 표피낭포, 혈관종, 그리고 횡문근육종 등이 있다¹²⁻¹⁴⁾.

구강 내 발생된 지방종의 치료 원칙은 수술적 절제이다. 수술 후 예후는 양호하며 재발은 거의 없는 것으로 보고되었다^{1,4,6)}. 본 증례에서도 수술적 절제를 시행하였으며, 이후 재발 없이 외래에서 추적 관찰하였다.

저자들은 국내에서는 처음이며 국제적으로는 3번째로, 출생 직후 확인된 구개열을 동반한 선천성 지방종을 경험하여 보고하는 바이다.

REFERENCES

- 1) Fregnani ER, Pires FR, Falzoni R, Lopes MA, Vargas PA. Lipomas of the oral cavity: clinical findings, histological classification and proliferative activity of 46 cases. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2003;32:49-53.
- 2) Mahabir RC, Mohammad JA, Courtemanche DJ. Lipoma of the cleft soft palate: a case report of a rare congenital anomaly. *Cleft Palate Craniofac J* 2000;37:503-5.
- 3) Gokul S, Ranjini KV, Kirankumar K, Hallikeri K. Congenital osteolipoma associated with cleft palate: a case report. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2009;38:91-3.
- 4) Taira Y, Yasukawa K, Yamamori I, Iino M. Oral lipoma extending superiorly from mandibular gingivobuccal fold to gingiva: a case report and analysis of 207 patients with oral lipoma in Japan. *Odontology* 2012;100:104-8.
- 5) Furlong MA, Fanburg-Smith JC, Childers EL. Lipoma of the oral and maxillofacial region: site and subclassification of 125 cases. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2004;98:441-50.
- 6) Manor E, Sion-Vardy N, Joshua BZ, Bodner L. Oral lipoma: analysis of 58 new cases and review of the literature. *Ann Diagn Pathol* 2011;15:257-61.
- 7) Morais HH, Vajgel A, Rocha NS, Carvalho RW, Caubi AF, Vasconcellos RJ. Congenital lipoma of the lip: a case report. *J Oral Sci* 2009;51:489-91.
- 8) Perri de Carvalho AC, Martinelli C, Sanches MG. Congenital lipoma in the oral cavity. A case report. *Quintessence Int* 1987; 18:799-802.
- 9) Dimitrakopoulos I, Zouloumis L, Trigonidis G. Congenital lipoma of the tongue. Report of a case. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1990;19:208.
- 10) Ghossaini SN, Hadi U, Tawil A. Oral-facial-digital syndrome type II variant associated with congenital tongue lipoma. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2002;94:324-7.
- 11) Radhakrishna Pillai OS, Vijayalakshmi S, Adarsha TV, Thahir M, Gopinathan UK, Mohammed N. Retropharyngeal lipoma - a case report. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg* 2007;59: 360-2.
- 12) He J, Wang Y, Zhu H, Qiu W, He Y. Nasopharyngeal teratoma associated with cleft palate in newborn: report of 2 cases. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2010;109:211-6.
- 13) Lesavoy MA, Nguyen DT, Yospur G, Dickinson BP. Nasopharyngeal encephalocele: report of transcranial and transpalatal repair with a 25-year follow-up. *J Craniofac Surg* 2009; 20:2251-6.
- 14) Dzieniecka M, Komorowska A, Grzelak-Krzymianowska A, Kulig A. Multiple congenital epuli (congenital granular cell tumours) in the newborn: a case report and review of literature. *Pol J Pathol* 2011;62:69-71.